

## روند تغییرات نیاز سرمایی گیاه پسته و پیش بینی آن با استفاده از مدل SDSM (مطالعه موردي: یزد)

ناصر پویان فر<sup>۱</sup>

غلامعلی مظفری<sup>۲</sup>

کمال امیدوار<sup>۳</sup>

احمد مزیدی<sup>۴</sup>

### چکیده

پسته همانند بسیاری از درختان میوه مناطق نیمه گرمسیری در چرخه سالیانه خود به یک دوره سرما نیاز دارد تا بعد از مهیا شدن شرایط مناسب، شکوفایی طبیعی جوانه‌ها اتفاق افتد. بدین منظور از مدل‌های مختلفی جهت محاسبه نیاز سرمایی استفاده می‌گردد. پهنه جغرافیایی مورد مطالعه، دشت یزد- اردکان واقع در استان یزد می‌باشد. برای انجام این تحقیق از داده‌های سه ساعته دمای ایستگاه سینوپتیک یزد طی دوره آماری ۱۳۹۶-۱۳۶۷ به منظور مدل سازی و برآورد مجموع ساعات سرمایی ماهانه پسته استفاده گردید، همچنین از داده‌های روزانه دمای این ایستگاه طی دوره آماری ۱۹۶۱-۲۰۰۵ جهت مدل سازی در مدل SDSM و از آمار ماهانه دمای سال‌های ۱۳۹۷-۱۳۸۵ جهت ارزیابی داده‌های ریزمقیاس شده مدل CanESM2 تحت سناریوهای مختلف RCP استفاده به عمل آمد. در نهایت مدل سازی برای سال‌های ۱۴۰۰-۱۴۲۹ انجام پذیرفت. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که بین ساعات تجمعی ماهانه دمای بین صفر تا ۷/۲ درجه سانتی گراد و پارامترهای دمایی ماهانه، نظیر میانگین حداقل دما، میانگین حداکثر دما و میانگین دمای ماهانه، همبستگی معنی داری وجود دارد که در شرایط عدم دسترسی به داده‌های ساعتی دما، برای مدل سازی و تعیین ساعات تجمعی ماهانه می‌توان از آن استفاده کرد. همچنین یافته‌ها نشان می‌دهد که نیاز سرمایی بعضی از ارقام پسته در سال‌های آتی تامین و برخی دیگر تامین نمی‌گردد.

**واژگان کلیدی:** پسته، تغییر اقلیم، نیاز سرمایی، SDSM، یزد- اردکان

### مقدمه

اقلیم شرایط متوسط آب و هوا برای یک محدوده خاص و یک دوره خاص است. با این توصیف براساس تعریف کمیته بین الدول تغییر اقلیم (IPCC)<sup>۱</sup>، تغییر اقلیم عبارت است از تغییر برگشت ناپذیر در متوسط شرایط آب و هوایی یک منطقه نسبت به رفتاری که در طول یک افق زمانی بلند مدت از اطلاعات مشاهده یا ثبت شده در آن منطقه مورد انتظار است. این تعریف به هرگونه تغییر در اقلیم که ناشی از فعالیت‌های انسانی یا ناپایداری طبیعی سیستم اقلیمی است اشاره دارد و از نوسان‌های کوتاه مدت اقلیمی متفاوت می‌باشد. آب و هوا یکی از عوامل تعیین کننده بهره‌وری در بخش کشاورزی است. با وجود تمامی پیشرفت‌های علمی و تکنولوژیکی در زمینه افزایش

<sup>۱</sup>. دانشجوی دکتری آب و هوشناسی، گروه جغرافیا، دانشگاه یزد

<sup>۲</sup>. دانشیار گروه جغرافیا، دانشگاه یزد (نویسنده مسئول)

Email : gmozafari@yazd.ac.ir -Tel: 09144123849

<sup>۳</sup>. استاد گروه جغرافیا، دانشگاه یزد

<sup>۴</sup>. دانشیار گروه جغرافیا، دانشگاه یزد

<sup>۵</sup> Intergovernmental Panel of Climate Change



عملکرد و تولید محصولات زراعی، کشاورزی به شدت به آب و هوا وابسته است، به همین دلیل، تنوع اقلیمی و تغییرات آن چه در کوتاه مدت (در طول فصل رشد) و چه دراز مدت، سهم تعیین کننده ای در موفقیت تولید دارد و به همین دلیل است که تأثیر تغییرات اقلیمی آینده بر کشاورزی مورد توجه جوامع علمی بین المللی قرار گرفته است (کوچکی و همکاران، ۱۳۹۴). تأثیر اقلیم بر کشاورزی بر حسب مقیاس مکانی و زمانی ارزیابی اثرات، متفاوت است. در مقیاس منطقه ای تکامل سیستم‌های کشاورزی و تنوع آنها در جهان تابع آب و هوا است، در حالی که در مقیاس کوچکتر، تغییرات فصلی و بین فصلی در رشد و نمو گیاهان، توسط شرایط آب و هوایی کنترل می‌گردد (روزنژویک و همکاران ۱۹۹۴). بر این اساس می‌توان نتیجه‌گیری کرد که بروز هرگونه تغییر احتمالی در اقلیم آینده، تولیدات کشاورزی را در سطوح مختلف دستخوش تغییرات جدی خواهد ساخت (نصیری محلاتی و کوچکی، ۱۳۸۵).

پسته (pistacia vera) گیاهی نیمه گرسنگی، دو پایه و خزان کننده از خانواده آنا کاردیاسه است (جعفری، ندوشن و احمدیان، ۱۳۸۷). گیاهان این خانواده به صورت درخت و درختچه هستند و گرده افسانی به صورت آزاد و به وسیله باد صورت می‌گیرد. جنس پسته دارای ۱۱ گونه پسته تنها سه گونه پسته اهلی (p.vera)، خنجک (p.khinjuk) و بنه (p.mutica) در ایران به صورت خودرو رویش دارند و بقیه گونه‌ها بومی سایر مناطق دنیا هستند (حسینی فرد و همکاران، ۱۳۹۶). گونه‌های پسته اهلی، میوه‌های خوارکی با ارزش اقتصادی بالا تولید می‌کنند و سایر گونه‌ها بیشتر به عنوان پایه برای پسته اهلی، تولید سفرز یا گاهی اوقات به صورت زینتی مورد استفاده قرار می‌گیرند (زوهراری، ۱۹۵۲). گیاه پسته از جمله گیاهانی است که به شدت وابسته به شرایط آب و هوایی محل است. تغییرات جهانی آب و هوا با تغییر در متوسط و واریانس داده‌های هواشناسی، احتمال رخداد وقایع حدی را بیشتر نموده و پیامدهای اساسی در چرخه سالانه گیاه به دنبال خواهد داشت. تغییرات آب و هوایی بر میزان دمای هوا، الگوی بارش، تبخیر سطحی، میزان رواناب و ذخایر رطوبتی خاک تاثیر گذار است (خسروی و همکاران، ۱۳۸۹). درختان میوه مناطق معتدله در چرخه سالیانه خود به یک دوره سرما نیاز دارند تا بعد از مهیا شدن شرایط مناسب، شکوفایی طبیعی جوانه‌ها اتفاق افتد. این سرمای مورد نیاز از دو جزء: درجه حرارت و مدت زمان تشکیل می‌شود. سال‌آوری تولید آن تابعی از تأمین نیاز سرمایی می‌باشد و این نیاز برای این محصول بین ارقام پسته اهلی متفاوت و بین ۶۰۰ تا ۱۲۰۰ ساعت گزارش شده است (حکم آبادی و جوانشاه، ۱۳۸۳).

مهمنترین ارقام تجاری پسته در ایران، اوحدی (فندقی)، کله قوچی، احمد آقایی، اکبری، ممتاز، خنجری، عباسعلی، شاه پسند، بادامی سفید، قرمز، دانشمندی، کال خندان، حاج عبدالهی و بادامی اردکان می‌باشند (وزارت جهاد کشاورزی، پژوهشکده پسته، ۱۳۹۶). نیاز سرمایی و محدوده دمایی موثر در گونه‌ها و حتی ارقام مختلف متفاوت است.

تحقیقات گسترده ای در زمینه پیش‌بینی نیاز سرمایی درختان میوه خزان دار در سطح جهان انجام پذیرفته است. بالدوکی و وون (۲۰۰۸) با بررسی انباست سرمایی در دوره پایه و آینده تحت شرایط تغییر اقلیم در کالیفرنیا مشخص کردند که تا اواخر قرن ۲۱، انباست سرمایی بسیاری از میوه‌ها در کالیفرنیا تامین نخواهد شد. آلموی و همکاران (۲۰۱۳) اثرات انباست سرمایی را بر روی عملکرد درختان پسته در مناطق گرم و خشک استرالیا بررسی کردند، برای انجام این تحقیق از سه مدل ساعت سرمایی (CH)<sup>۱</sup>، یوتا (UT)<sup>۲</sup> و دینامیکی (CP)<sup>۳</sup> استفاده گردید و مدل یوتا به عنوان بهترین مدل تعیین شد. آنها با استفاده از مدل یوتا و داده‌های دمای ۴۰۰ ایستگاه در استرالیا، وضعیت انباست سرمایی در دوره گذشته و دوره آینده تا سال ۲۰۳۰ را بررسی و دلیل اصلی کاهش انباست سرمایی را افزایش گرمایش جهانی دانستند. اکبری و همکاران (۱۳۹۲) نیاز سرمایی پسته و رابطه بین میانگین دمای روزانه و نیاز سرمایی در شهرستان‌های کرمان و رفسنجان در ایران را مورد بررسی قرار دادند. در این پژوهش براساس داده‌های یک ساعته دمای طی سال زراعی ۱۳۷۸-۱۳۸۸ و با استفاده از دو مدل ساعت سرمایی (CH) و یوتا (UT)، نیاز سرمایی درختان پسته تعیین و با استفاده از

<sup>1</sup>-Chilling hours

<sup>2</sup>-Utah


<sup>3</sup>-Chill portions



داده‌های طولانی مدت، مدل ریاضی نیاز سرمایی بر اساس میانگین دمای روزانه تعیین گردید. گیو و همکاران (۲۰۱۴) انباشت سرمایی برای گلدهی درختان میوه مناطق معتدل را بررسی کردند، آنها مشخص کردند که در سری زمانی ۵۰ ساله، روند افزایشی در نیاز سرمایی وجود دارد، در حالی که انباشت سرمایی تقریباً ایستاده است. کافمن و بلانک (۲۰۱۶) در ارزیابی عملکرد سه مدل عددی ارزیابی انباشت سرمایی درختان میوه در آلمان، مشخص کردند که در اثر تغییرات آب و هوایی، انباشت سرمایی کاهش پیدا کرده است. فلاخ قاله‌ری و احمدی (۱۳۹۷) به منظور واکاوی الگوی انباشت سرمایی مناطق سردسیر ایران از مدل‌های ساعت سرمایی، واحدهای سرمایی و دینامیکی برای برآورده انباشت سرمایی استفاده نمودند. در این تحقیق از داده‌های سه ساعته دمای هوا برای ۲۸ ایستگاه هواشناسی سینوپتیک در مناطق سردسیر و کوهستانی کشور از سال ۱۹۸۵ تا ۲۰۱۳ استفاده گردید. نتایج تحقیق نشان داد که میزان انباشت سرمایی در دهه‌های گذشته بیشتر از دهه‌های اخیر است. تحقیق حاضر با استفاده از مدل ساعت سرمایی (CH) و با هدف بررسی انباشت سرمایی زمستانه برای تعدادی از ارقام مهم پسته در سطح دشت یزد-اردکان و اثر تغییر اقلیم و گرمایش جهانی بر تامین نیاز سرمایی پسته در این منطقه انجام پذیرفته است.

## داده‌ها و روش‌ها

دشت یزد-اردکان در محدوده طول جغرافیایی  $5^{\circ}15' - 5^{\circ}30'$  شرقی و عرض جغرافیایی  $31^{\circ}45' - 32^{\circ}05'$  شمالی با مساحت ۶۵۰۰ کیلومترمربع در استان یزد قرار دارد (شکل ۱). این دشت یکی از مناطق عمده کاشت پسته در سطح استان محسوب می‌شود. ایستگاه هواشناسی سینوپتیک یزد از جمله ایستگاه‌های بسیار قدیمی در این منطقه است که در عرض جغرافیایی  $31^{\circ}54'31''$  شمالی، طول جغرافیایی  $5^{\circ}17'20''$  شرقی و ارتفاع ۱۲۳۷ متر از سطح دریا در شهر یزد واقع گردیده و معرف مناسبی برای محدوده ی مورد مطالعه می‌باشد.



شکل ۱. موقعیت جغرافیایی دشت یزد-اردکان

برای بررسی اثر تغییر اقلیم بر نیاز سرمایی ارقام مختلف پسته، از داده‌های سه ساعته دمای این ایستگاه، شامل ۲۵۰۰۰ رکورد، طی دوره آماری ۱۳۶۷-۱۳۹۶ شمسی، به منظور مدل سازی و برآورد مجموع ساعت سرمایی ماهانه پسته استفاده گردید. جهت ریزمقیاس‌نمایی از مدل SDSM<sup>۱</sup> و از آمار روزانه دمای این ایستگاه طی دوره آماری ۱۳۳۹ لغاًیت ۱۳۸۴ شمسی استفاده شد. این دوره مصادف با سالهای ۱۹۶۱-۲۰۰۵ میلادی است که با توجه به ماهیت مدل و نیاز به دوره آماری میلادی، ابتدا تاریخ‌های شمسی به میلادی تبدیل و سپس وارد مدل مذکور گردیدند. در نهایت از آمار ماهانه دمای سالهای ۱۳۹۷-۱۳۸۵ جهت ارزیابی داده‌های ریزمقیاس شده مدل CanESM2<sup>۲</sup> تحت سناریوهای مختلف RCP<sup>۳</sup> استفاده به عمل آمد.

### ریزمقیاس‌نمایی مقادیر دما

در پژوهش حاضر به منظور برآورد داده‌های دمای آینده از مدل گردش عمومی جو CanESM2 تحت سه سناریو RCP ۸/۵، RCP ۴/۵ و RCP ۲/۶ از مدل ریزمقیاس‌نمایی آماری SDSM نسخه ۵/۳ جهت ریزمقیاس‌نمایی داده‌های خروجی استفاده شده است. مدل CanESM2 یک مدل جامع و جفت شده و چهارمین نسل از مدل‌های گردش عمومی جفت شده (CGCM4)<sup>۴</sup> است و جزء سری مدل‌های CMIP5<sup>۵</sup> و گزارش پنجم<sup>۶</sup> (AR5) هیئت بین‌الدول تغییر اقلیم (IPCC) می‌باشد (ارورا و همکاران، ۲۰۱۱). در گزارش پنجم دقت شبیه سازی و وضوح مکانی مدل‌ها نسبت به گزارش پیشین افزایش یافته است. در سناریوهای RCP، محدوده مستدل تری از خط سیرهای تولیدگازهای گلخانه‌ای<sup>۷</sup> (GHGs) نسبت به سناریوهای SRES<sup>۸</sup> در گزارش چهارم (AR4)<sup>۹</sup> ارزیابی شده است.

به طورکلی عدم قطعیت‌ها در گزارش اخیر کاهش یافته است. سناریوهای RCP شامل یک سناریوی کاهشی سختگیرانه (RCP2/6)، دو سناریوی حد واسط (RCP ۴/۵ و RCP ۶) و یک سناریوی بدینانه (RCP ۸/۵) با تولید گازهای گلخانه‌ای بسیار بالا می‌باشند. اثر گازهای گلخانه‌ای بر واداشت تابشی را در سال ۲۱۰۰ به ترتیب تا ۸/۵، ۶/۴، ۵/۲ وات بر مترمربع تخمین زده اند (IPCC, ۲۰۱۴). مدل SDSM یک ابزار رگرسیون بنیان چندگانه است و امروزه به عنوان پرکاربردترین مدل ریز مقیاس‌نمایی و بهترین مولد داده شرطی در سطح جهان شناخته شده است. رضایی و همکاران (۱۳۹۳) در تحقیقی در خصوص بررسی کارایی مدل ریز مقیاس‌نمایی آماری SDSM در پیش‌بینی پارامترهای دمایی دو اقلیم خشک کرمان و بم نشان دادند که این مدل از کارایی بالاتر و قابل قبولی برای پیش‌بینی دما برخوردار است. همچنین سبحانی و همکاران (۱۳۹۴)، فاسمی فر و همکاران (۱۳۹۵)، لوپز و همکاران (۲۰۰۸) و کان و همکاران (۲۰۱۶) نشان دادند مدل SDSM مدلی با خطای بسیار پایین جهت شبیه سازی و ارزیابی اثرات تغییر اقلیم به ویژه دما است. عملکرد و ساختار مدل SDSM در چهار مرحله خلاصه می‌شود: انتخاب متغیرهای پیش‌بینی کننده به نام متغیر مستقل، واسنجی مدل، ارزیابی مدل و تولید سناریوهای آتی (ویلی و همکاران، ۲۰۱۴). بعد از آن کالیبراسیون مدل انجام می‌پذیرد و با سعی و خطا و در نظر گرفتن معیارهای ارزیابی، بهترین

1 -Statisticah Downscaling Model

2 -Second generation Canadian Earth System Model

3 -Representative concentration pathway

4 -Fourth-generation Coupled Global Climate Model

5 -Coupled Model Intercompaison Project Phase5

6 -Fifth Assessment Report of the IPCC

7 -Greenhouse Gases

8 -Special Report on Emissions Scenarios

9 -Fourth Assessment Report of the IPCC



دوره از بین آن ها سری ای انتخاب می شود که بیشترین همبستگی را با داده های مشاهداتی داشته باشد. برای آزمون کارایی مدل از معیارهای  $R^2$ ،  $MAE$ <sup>۲</sup> و  $RMSE$ <sup>۳</sup> استفاده می شود (طائی سمیرومی و همکاران، ۱۳۹۳).

در این مطالعه به منظور بررسی میزان حساسیت مدل SDSM به خروجی مدل جهانی، شاخص دما با استفاده از داده های تاریخی مدل CanESM2 شبیه سازی و سپس با داده های مشاهداتی مقایسه و توانایی مدل بزرگ مقیاس در تولید سناریو برای دوره های آتی مورد ارزیابی قرار گرفت. پس از این مراحل با استفاده از داده های دوره زمانی آینده مدل بزرگ مقیاس مورد نظر، داده های دما برای دوره زمانی ۱۴۰۰-۱۴۲۹ تحت سه سناریو تایید شده IPCC برآورد گردید.

### مدل های نیاز سرمایی

جهت برآورد مقادیر نیاز سرمایی از مدل های متعددی استفاده می شود. در تمامی این مدل ها حرف T معادل دمای ساعتی بر حسب درجه سانتی گراد است. مدل ساعات سرمایی که با علامت (CH) نشان داده می شود، یکی از پر کاربردترین مدل ها می باشد که به مدل واینبرگ معروف است (واینبرگ، ۱۹۵۰). این مدل یک تابع تک مرحله ای است که نیاز سرمایی یک ساعت را برای هر بازه زمانی با دمایی در بین  $7/2$  صفر تا درجه سانتی گراد ثبت می کند. در این مدل تعداد ساعات سرمایی در زمان t (زمان از آغاز دوره رکود بر حسب ساعت) بر اساس معادله ۱ بدست می آید.

$$CH = \sum_{i=1}^t T_{7,2}, \text{with } T_{7,2} = \begin{cases} 0^{\circ}\text{C} < T < 7.2^{\circ}\text{C}: 1 \\ \text{else} : 0 \end{cases} \quad \text{معادله ۱}$$

در مدل یوتا (UT) به عنوان یک مدل وزن دار شده، دماهای بالا بر روی انباست سرمایی اثر منفی می گذارند. در این مدل دماهای کمتر از  $1/4$  درجه سانتی گراد و بیشتر از  $12/4$  درجه سانتی گراد بدون ارزش سرمایی و دماهای بالاتر از  $15/9$  درجه سانتی گراد، اثری منفی دارند. دماهای بین  $1/4$  تا  $2/4$  درجه، دارای ارزش سرمایی  $5/5$ ، دماهای بین  $2/4$  تا  $9/1$  درجه، دارای ارزش سرمایی ۱ و دماهای بین  $9/1$  تا  $12/4$  درجه سانتی گراد نیز ارزش سرمایی  $5/5$ . برخوردار می باشند. در این مدل تعداد ساعات سرمایی در زمان t بر اساس معادله ۲ بدست می آید.

$$UT = \sum_{i=1}^t T_U, \text{with } T_U = \begin{cases} T \leq 1.4^{\circ}\text{C} : 0 \\ 1.4^{\circ}\text{C} < T \leq 2.4^{\circ}\text{C} : 0.5 \\ 2.4^{\circ}\text{C} < T \leq 9.1^{\circ}\text{C} : 1 \\ 9.1^{\circ}\text{C} < T \leq 12.4^{\circ}\text{C} : 0.5 \\ 12.4^{\circ}\text{C} < T \leq 15.9^{\circ}\text{C} : 0 \\ 15.9^{\circ}\text{C} < T \leq 18.0^{\circ}\text{C} : -0.5 \\ T \geq 18.0^{\circ}\text{C} : -1 \end{cases} \quad \text{معادله ۲}$$

1- R.squared

2- Root Mean Square Error

3-Mean Absolute Error

در مدل یوتا مثبت (UTpos)<sup>۱</sup> دماهای کمتر از  $1/4$  درجه سانتی گراد و بیشتر از  $12/4$  درجه سانتی گراد بدون ارزش سرمایی می باشند، ضمن اینکه بر خلاف مدل (UT)، دماهای بالاتر نیز بدون ارزش سرمایی می باشند. در این مدل تعداد ساعت‌های سرمایی در زمان  $t$  بر اساس معادله<sup>۳</sup> بدست می آید.

معادله<sup>۳</sup>

$$UT_{pos} = \sum_{i=1}^t T_{U^+}, \text{with } T_{U^+} = \begin{cases} T \leq 1.4^\circ\text{C} & : 0 \\ 1.4^\circ\text{C} < T \leq 2.4^\circ\text{C} & : 0.5 \\ 2.4^\circ\text{C} < T \leq 9.1^\circ\text{C} & : 1 \\ 9.1^\circ\text{C} < T \leq 12.4^\circ\text{C} & : 0.5 \\ T \geq 12.4^\circ\text{C} & : 0 \end{cases}$$

برای تعیین انباشت سرمایی لازم است که دمای هرساعت در شباهنگ روز در دسترس باشد، از آنجا که آمار سازمان هواشناسی به صورت سینوپ سه ساعته در اختیار کاربران قرار می گیرد. برای محاسبه انباشت سرمایی لازم است دمای هر ساعت در هر شباهنگ روز مشخص تا مدل های محاسبه ساعت‌های سرمایی بتوانند ارزش سرمایی ساعت‌های مختلف را محاسبه کنند لذا از روش درون یابی خطی برای تبدیل دمای سه ساعته به دمای ساعتی استفاده شد. در این روش اختلاف دمای سه ساعت قبل با سه ساعت بعد محاسبه و با تقسیم بر بازه سه ساعته، میزان افزایش و یا کاهش دما در هر ساعت بدست می آید که با توجه به افزایش و یا کاهش دما، این مقدار به دمای قبلی افزوده و یا کم می شود. بدین منظور با استفاده از امکانات برنامه نویسی نرم افزار اکسل، برنامه لازم نوشته و سپس با اعمال داده ساعتی، سری زمانی مجموع انباشت ساعتی از سال ۱۳۹۶-۱۳۶۷ برای دوره رکود محاسبه گردید. درنهایت میزان ساعت‌های سرمایی بر اساس ارقام مختلف تعیین و ارتباط بین ساعت‌های سرمایی روزانه با مقادیر میانگین دمای حداقل و حداکثر و میانگین دمای ماهانه با هدف کاربرد آن در ارائه مدل نهائی مورد استفاده قرار گرفت. دوره زمانی محاسبه نیاز سرمایی برای درختان پسته در ایران از نیمه آبان تا پایان بهمن ماه می باشد. این نیاز سرمایی بین ارقام مختلف پسته اهلی متفاوت و بین ۶۰۰ تا ۱۲۰۰ ساعت گزارش شده است (حکم آبادی و جوانشاه، ۱۳۸۳). نیاز سرمایی ارقام مهم در منطقه مطالعاتی در جدول ۱ ارائه گردیده است.

جدول ۱- نیاز سرمایی ارقام غالب پسته

ساعت	ارقام
۶۰۰	کله قوجی
۸۰۰	اوحدی
۱۰۰۰	احمد آقایی
۱۲۰۰	اکبری
۱۲۰۰	فندقی

مانند: حکم آبادی و جوانشاه (۱۳۸۳)



## نتایج و بحث

### برآورد مجموع ساعت سرمایی ماهانه پسته با استفاده از مدل های تعیین نیاز سرمایی

با فرا رسیدن فصل پاییز، رشد درختان خزان دار متوقف می شود و با کوتاه شدن طول روز و کاهش دما، گیاه وارد مرحله رکود می شود، ولی خروج از این مرحله مستلزم تامین نیاز سرمایی گیاه می باشد، به طوری که بدون این مرحله، چرخه سالانه گیاه تکمیل نشده و قادر به رشد طبیعی نخواهد بود(طالعی، ۱۳۶۷). حداقل زمان لازم برای سرمادهی یک رقم در طی فصل رکود که موجب از سرگیری رشد طبیعی آن در فصل رویش می شود نیاز سرمایی نامیده می شود.

در جدول ۲، معادلات مختلف تخمین مجموع ساعت سرمایی ماهانه پسته در ایستگاه یزد ارائه شده است. در این جدول از مدل های مختلف برآورد نیاز سرمایی استفاده شده و به کمک پارامترهای میانگین دمای حداقل ماهانه ( $T_{\min}$ )، میانگین دمای حداکثر ماهانه ( $T_{\max}$ ) و دمای میانگین ماهانه ( $T_{\text{avg}}$ )، مجموع ساعت سرمایی ماهانه پسته بر حسب ساعت در ماه، قابل برآورد است. مدل دمای بین  $\frac{7}{2}$  درجه سلسیوس (CH)، مدل واحدهای سرمایی یوتا (UT) و مدل واحدهای سرمایی یوتا مثبت (Upos) سه مدل استفاده شده در این پژوهش می باشد. مهمترین مزیت معادلات مذکور، سهولت کاربری آنها بدليل استفاده از پارامترهای هوشمناسی قابل وصول، برای برآورد ساعت سرمایی ماهانه، یعنی دمای حداقل ماهانه ( $T_{\min}$ )، میانگین دمای حداکثر ماهانه ( $T_{\max}$ ) و دمای میانگین ماهانه ( $T_{\text{avg}}$ ) است، بطوریکه کاربر می تواند پس از محاسبه یکی از این سه پارامتر برای هر یک از ماه های سال (آبان، آذر، دی و بهمن) و استفاده از معادلات مذکور، به مجموع ساعت سرمایی ماهانه پسته بر حسب ساعت در ماه دست یابد.

جدول ۲- معادلات تخمین مجموع ساعت سرمایی ماهانه پسته از طریق مدل های مختلف برآورد نیاز سرمایی به کمک پارامترهای میانگین دمای حداقل ماهانه ( $T_{\min}$ )، میانگین دمای حداکثر ماهانه ( $T_{\max}$ ) و دمای میانگین ماهانه ( $T_{\text{avg}}$ ) در ایستگاه یزد

سرمایی گیاه	نام مدل برآورد ساعت	معادله تخمین ساعت سرمایی (بر حسب ساعت در ماه)	پارامتر مربوطه	دقیقت معادله مربوطه			
				MAE	RMSE	r	R <sup>2</sup>
مدل ساعت سرمایی (CH)	میانگین دمای حداقل ماهانه ( $T_{\min}$ )	CH = $\frac{37}{37} \cdot T_{\min} + \frac{348}{8}$	۴۸	۶۳	-۰/۸۷	-۰/۷۵۶	
	میانگین دمای حداکثر ماهانه ( $T_{\max}$ )	CH = $-\frac{28}{44} \cdot T_{\max} + \frac{695}{2}$	۵۲	۶۷	-۰/۸۵	-۰/۷۲۳	
	دما میانگین ماهانه ( $T_{\text{avg}}$ )	CH = $-\frac{34}{43} \cdot T_{\text{avg}} + \frac{566}{3}$	۴۴	۵۹	-۰/۸۹	-۰/۷۸۶	
مدل واحدهای سرمایی (UT)	میانگین دمای حداقل ماهانه ( $T_{\min}$ )	U = $-\frac{40}{54} \cdot T_{\min} + \frac{387}{3}$	۷۷	۱۰۱	-۰/۷۷	-۰/۵۸۷	
	میانگین دمای حداکثر ماهانه ( $T_{\max}$ )	U = $-\frac{32}{81} \cdot T_{\max} + \frac{795}{2}$	۷۸	۹۵	-۰/۸۰	-۰/۶۳۵	
	دما میانگین ماهانه ( $T_{\text{avg}}$ )	U = $-\frac{38}{67} \cdot T_{\text{avg}} + \frac{636}{1}$	۷۳	۹۳	-۰/۸۱	-۰/۶۵۴	
مدل واحدهای سرمایی (UTpos)	میانگین دمای حداقل ماهانه ( $T_{\min}$ )	U <sup>+</sup> = $-\frac{29}{49} \cdot T_{\min} + \frac{414}{2}$	۷۶	۹۲	-۰/۶۹	-۰/۴۷۸	
	میانگین دمای حداکثر ماهانه ( $T_{\max}$ )	U <sup>+</sup> = $-\frac{23}{12} \cdot T_{\max} + \frac{698}{7}$	۷۶	۹۱	-۰/۷۰	-۰/۴۸۶	
	دما میانگین ماهانه ( $T_{\text{avg}}$ )	U <sup>+</sup> = $-\frac{27}{62} \cdot T_{\text{avg}} + \frac{590}{2}$	۷۴	۸۹	-۰/۷۲	-۰/۵۱۴	

مأخذ: محاسبات نگارنده

در این جدول، آماره های خطای مربوط به هر معادله به منظور تشخیص کارآیی هر یک از معادلات مذکور ارائه گردیده است. این آماره ها شامل میانگین خطای مطلق (MAE)، مجدد میانگین مربعات خطای مطلق (RMSE)، ضریب همبستگی (r) و ضریب تبیین (R<sup>2</sup>) است. بدیهی است که کمتر بودن مقادیر MAE و RMSE و بالاتر بودن مقادیر r و R<sup>2</sup> به منزله مناسب تر بودن مدل مورد نظر برای تخمین مجموع ساعت سرمایی ماهانه پسته در ایستگاه یزد می باشد. بعنوان مثال، در هر سه مدل برآورد نیاز سرمایی یعنی UT، CH، U<sup>+</sup> یا U<sup>+</sup> مثبت، آن دسته از معادلاتی که بر مبنای  $T_{\text{avg}}$  هستند، دقیق بالاتری نسبت به معادلات بر مبنای  $T_{\min}$  و  $T_{\max}$  دارند و به همین دلیل

این دسته از معادلات قابل توصیه می‌باشند. در جدول مذکور، این معادلات بصورت تیوهتر نشان داده شده‌اند. اما صرفنظر از اینکه نتایج کدامیک از مدل‌های موجود، در زمینه برآورد ساعت سرمایی پسته از دیدگاه فیزیولوژی گیاه پسته دقت و صحت بالاتری دارند، اما از دیدگاه مدل‌سازی اثرات تغییر اقلیم در آینده و به منظور ایجاد ارتباط آماری مناسب بین نتایج مدل‌های موجود و متغیرهای مختلف هواشناسی ( $T_{\text{avg}}$ ،  $T_{\text{max}}$  و  $T_{\text{min}}$ )، مدل CH نسبت به مدل‌های یوتا و یوتا مشبت، ارجح تشخیص داده شد بطوریکه نتایج مدل CH همبستگی آماری مناسبی با هر یک از متغیرهای  $T_{\text{avg}}$ ،  $T_{\text{min}}$  و  $T_{\text{max}}$  دارد. همچنین در بین متغیرهای مذکور، پارامتر  $T_{\text{avg}}$  نسبت به پارامترهای  $T_{\text{min}}$  و  $T_{\text{max}}$  برای مدل سازی مناسب‌تر تشخیص داده شد. بنابراین پیشنهاد می‌گردد که از رابطه رگرسیونی زیر (معادله ۴) برای مدل‌سازی اثرات تغییر اقلیم بر نیاز سرمایی پسته استفاده شود:

$$\text{CH} = -34/44 * T_{\text{avg}} + 566/3 \quad (\text{with MAE}=44, \text{RMSE}=59, r=+0.89, R^2=+0.786) \quad \text{معادله ۴}$$

در این معادله  $T_{\text{avg}}$  میانگین دمای ماهانه و CH مجموع ماهانه ساعت سرمایی بین  $0^\circ$  تا  $7/2^\circ$  درجه سلسیوس در ماه مورد نظر (بر حسب ساعت) می‌باشد. این معادله در شرایط عدم دسترسی به داده‌های ساعتی دمای هوا کاربرد دارد، به طوریکه با داشتن دمای میانگین هوا در هر ماه، می‌توان به تقریبی از ساعت سرمایی حادث شده در آن ماه بر حسب ساعت (CH) یا تعداد ساعتی که دمای هوا بین صفر تا  $7/2^\circ$  درجه سلسیوس بوده است) رسید. در مورد گیاه پسته با توجه به اینکه دوره رکود این گیاه از نیمه آبان تا آخر بهمن قرار دارد، بدیهی است که در صورت داشتن میانگین دمای هوا در هر یک از این ماه‌ها، می‌توان اقدام به محاسبه CH در هر ماه و نهایتاً با تجمیع آنها، کل ساعت سرمایی حادث شده طی دوره مذکور را بر حسب ساعت برآورد نمود.


#### تعیین روند تغییرات نیاز سرمایی پسته در دوره پایه به روش آزمون شبیه سنج

جهت برآورد نمودن شبیه واقعی یک روند در یک سری زمانی، استفاده از روش ناپارامتریک سنس یکی از روش‌های مناسب در این زمینه می‌باشد. مقادیر Q در این روش نشان دهنده شبیه خط می‌باشد، اگر حد بالا و پایین Q هر دو مثبت باشد، فرض وجود روند افزایشی در دما رد نمی‌شود.

اگر حد بالا و پایین Q هر دو منفی باشد فرض وجود روند کاهشی در دما ثابت می‌شود و اگر حد بالا و پایین مثبت و منفی باشد، فرض وجود روند تایید نمی‌گردد (مسعودیان، ۱۳۸۳). بر این اساس با توجه به مقادیر منفی حد بالا و پایین Q در سطح اطمینان ۹۵ درصد، روند مقادیر ساعت سرمایی تجمعی دمایی بین صفر تا  $7/2^\circ$  درجه سانتی گراد در دوره رکود درختان پسته در منطقه مطالعاتی طی سی سال تحت بررسی (۱۳۶۷-۱۳۹۶) بصورت منفی و نزولی بوده است (جدول ۳). بطور کلی برآشن نمودار خط سنس نیز حاکی از کاهش مقادیر ساعت سرمایی در طول دوره آماری در ایستگاه مورد مطالعه است (شکل ۲).

جدول ۳- نتایج حاصل از آزمون سنس در سطوح اطمینان ۹۹ و ۹۵ درصد (ایستگاه سینوبیک یزد)



B	Q max ٪۹۹	Q min ٪۹۹	Q max ٪۹۵	Q min ٪۹۵	Q
۱/۰۳	۲/۲۳	-۱/۳۸	-۱/۵۴	-۱/۱۰	-۵/۹



شکل ۲: برآذش نمودار خط سنس بر ساعت تجمعی دماهای بین  ${}^{\circ}\text{C}$  تا  ${}^{\circ}\text{C}$  درجه سانتی گراد در طی دوره آماری

### مقایسه دماهای دوره پایه با نتایج بدست آمده توسط مدل جهانی CanESM2

به منظور مقایسه دماهای مشاهداتی در دوره پایه (۱۹۶۱-۲۰۰۵) و شبیه سازی شده توسط مدل CanESM2، از میانگین و واریانس دمای حداقل و حد اکثر دمای روزانه ایستگاه یزد استفاده گردید. به استناد شکل ۳، میانگین و واریانس دمای حداقل و حد اکثر ایستگاه یزد در دوره پایه و شبیه سازی شده بسیار شبیه هم بوده و از انطباق مناسبی برخوردارند.



شکل ۳- مقایسه میانگین و واریانس دمای حداقل و حد اکثر ایستگاه یزد پس از انجام کالیبراسیون و ریزمقیاس سازی داده های مدل SDSM توسط نرم افزار CanESM2

## شبیه سازی وضعیت دمای آینده توسط مدل CanESM2

نتایج حاصل از مقایسه میانگین دمای حداقل، میانگین دمای حداکثر و میانگین دمای ماهانه مشاهده شده در ایستگاه یزد در دوره پایه(۱۳۹۶-۱۳۶۷) با پیش‌بینی‌های صورت گرفته توسط مدل CanESM2 و سناریوهای مختلف RCP در دهه‌های آتی (۱۴۲۹-۱۴۰۰) در جدول ۴ ارائه گردیده است.

جدول ۴- مقایسه میانگین دمای حداقل، حداکثر و میانگین دمای ماهانه مشاهده شده در ایستگاه یزد در دوره پایه (۱۳۹۶-۱۳۶۷) با پیش‌بینی‌های صورت گرفته توسط مدل CanESM2 و سناریوهای مختلف RCP در دهه‌های آتی (۱۴۰۰-۱۴۲۹)

دوره پایه و سناریو	پایه		RCP ۲/۶			RCP ۴/۵			RCP ۸/۵			
	میانگین دمای حداقل پایه	میانگین دمای حداکثر پایه	میانگین دمای ماهانه پایه	میانگین دمای حداقل پایه	میانگین دمای حداکثر پایه	میانگین دمای ماهانه پایه	میانگین دمای حداقل پایه	میانگین دمای حداکثر پایه	میانگین دمای ماهانه پایه	میانگین دمای حداقل پایه	میانگین دمای حداکثر پایه	میانگین دمای ماهانه پایه
ماه	میانگین دمای حداقل پایه	میانگین دمای حداکثر پایه	میانگین دمای ماهانه پایه	میانگین دمای حداقل پایه	میانگین دمای حداکثر پایه	میانگین دمای ماهانه پایه	میانگین دمای حداقل پایه	میانگین دمای حداکثر پایه	میانگین دمای ماهانه پایه	میانگین دمای حداقل پایه	میانگین دمای حداکثر پایه	میانگین دمای ماهانه پایه
آبان	۵/۲	۲۰/۳	۱۲/۷	۴/۲	۲۱	۱۲/۶	۴/۴	۲۱	۱۲/۷	۴/۱	۲۰/۸	۱۲/۵
آذر	۱/۴	۱۶/۳	۸/۹	۱/۲	۱۷	۹/۱	۰/۸	۱۷/۶	۸/۷	۱	۱۷/۱	۹
دی	-۰/۶	۱۲/۷	۶/۱	-۱/۱	۱۳/۴	۶/۲	-۰/۱	۱۳/۶	۶/۳	-۰/۸	۱۳/۸	۶/۵
بهمن	-۰/۶	۱۴/۱	۷/۳	۰/۴	۱۴/۴	۷/۴	۰/۳	۱۴/۷	۷/۵	۰/۴	۱۴/۸	۷/۶

نتایج مدل سازی نشان میدهد میانگین دمای حداقل ماهانه در ماههای آبان، آذر و دی در سناریوهای RCP ۲/۶، RCP ۴/۵ و RCP ۸/۵ نسبت به دوره پایه کاهش و در بهمن افزایش می‌یابد. میانگین دمای حداکثر ماهانه در تمامی ماه‌ها و در تمامی سناریوها افزایشی بوده و میانگین دمای ماهانه در ماه‌های آبان و آذر، حول میانگین و در ماه‌های دی و بهمن با شبیه ملایم دارای روند افزایشی است.

### ارزیابی و مقایسه نتایج حاصل از سناریوهای مختلف RCP در پیش‌بینی دمای ایستگاه یزد طی بازه زمانی ۲۰۰۶-۲۰۱۸

با توجه به اینکه اعداد ارائه شده توسط مدل CanESM2 مربوط به بازه زمانی ۲۰۰۶ به بعد (تا سال ۲۰۹۹ میلادی)، جزء دوره پیش‌بینی مدل محسوب می‌گردد، و از طرفی این دوره عملاً رخداده و آمار واقعی مربوط به ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۸ (۱۳۸۵-۱۳۹۷) موجود بوده است، امکان مقایسه نتایج کسب شده از سناریوهای مختلف RCP در پیش‌بینی دمای ایستگاه یزد طی بازه زمانی ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۷ را فراهم گردید. به منظور ارزیابی روش‌های مورد استفاده در برآورد دما، مقایسه داده‌های تولید شده توسط مدل و داده‌های واقعی با استفاده از معیارهای متداول آماری ضریب همبستگی ( $r$ )، ضریب تعیین ( $R^2$ )، جذر میانگین مربعات خطای (RMSE) و میانگین خطای مطلق (MAE) انجام شد که نتایج در جدول ۵ ارائه گردیده است.




جدول ۵- ارزیابی داده‌های ریزمقیاس شده مدل CanESM2 تحت سناریوهای مختلف RCP طی بازه زمانی ۱۳۸۵-۱۳۹۷

نام سناریو	پارامتر پیش‌بینی شده	دقت سناریو			
		MAE	RMSE	r	R2
RCP2/6	دماهی حداقل	۴/۲	۵/۳	.۸۶	.۷۴
	دماهی حداکثر	۴/۷	۶/۱	.۸۳	.۶۹
	دماهی میانگین	۳/۶	۴/۶	.۸۹	.۸۰
RCP4/5	دماهی حداقل	۴/۲	۵/۴	.۸۶	.۷۴
	دماهی حداکثر	۴/۷	۶/۱	.۸۳	.۶۹
	دماهی میانگین	۳/۶	۴/۶	.۸۹	.۷۹
RCP8/5	دماهی حداقل	۴/۲	۵/۳	.۸۶	.۷۴
	دماهی حداکثر	۴/۷	۶/۱	.۸۳	.۶۹
	دماهی میانگین	۳/۵	۴/۵	.۸۹	.۸۰

براساس جدول فوق، تقریباً سناریوهای تغییر اقلیم (RCP2/6، RCP4/5، RCP8/5) از کارایی مشابهی در برآورد دماهی حداقل، دماهی حداکثر و دماهی میانگین ماهانه در ایستگاه بزد برخوردارند، اما به دلیل اینکه در دماهی میانگین، نسبت به پارامترهای دماهی حداقل و حداکثر، مقادیر MAE و RMSE کمتر و مقادیر  $r^2$  بیشتر می‌باشد، لذا دماهی میانگین، کارایی بیشتری نسبت به سایر پارامترها دارد.

#### برآورد نیاز سرمایی ماهانه و سالانه پسته در دهه‌های آتی و مقایسه آن با دوره پایه

با توجه به دقیقیت پارامتر میانگین دماهی ماهانه در مقایسه با پارامترهای میانگین دماهی حداقل و حداکثر ماهانه در برآورد نیاز سرمایی، از این پارامتر برای برآورد نیاز سرمایی ماهانه و سالانه پسته در دهه‌های آتی استفاده به عمل آمد. بررسی شکل ۴ و جدول ۶ که مقادیر استخراج شده از شکل مذکور را نشان میدهد بیان کننده این موضوع است که میزان ساعات سرمایی در آبان در سناریوهای RCP ۲/۶ و RCP ۴/۵ تقریباً معادل دوره پایه می‌باشد. در آذر به جز RCP ۴/۵ که ساعات سرمایی افزایش یافته است در ۲/۶ RCP و ۸/۵ RCP کاهشی می‌باشد. در ماههای دی و بهمن در تمامی سناریوها کاهش تامین نیاز سرمایی وجود دارد.




شکل ۴- مقایسه مجموع ساعات سرمایی ماهانه ایستگاه بزد در دوره پایه (۱۳۶۷-۱۳۹۶) با پیش‌بینی‌های صورت گرفته توسط مدل CanESM2 تحت سناریوهای مختلف RCP در دهه‌های آتی (۱۴۰۰-۱۴۲۹)

جدول ۶- مقایسه مجموع ساعات سرمایی ماهانه ایستگاه یزد در دوره پایه (۱۳۶۷-۱۳۹۶) با پیش‌بینی‌های صورت گرفته توسط مدل CanESM2 تحت سناریوهای مختلف RCP در دهه‌های آتی (۱۴۰۰-۱۴۲۹)

سناریو\ماه	پایه	RCP ۲/۶	RCP ۴/۵	RCP ۸/۵
آبان	۱۲۸	۱۳۲	۱۲۹	۱۳۷
آذر	۲۶۱	۲۵۴	۲۶۵	۲۵۵
دی	۳۵۸	۳۵۳	۳۵۰	۳۴۳
بهمن	۳۱۴	۳۱۰	۳۰۸	۳۰۳
جمع	۱۰۶۱	۱۰۴۹	۱۰۵۲	۱۰۳۸

شکل ۵ نشان میدهد که ساعات سرمایی مورد نیاز ارقام پسته در دوره پایه به میزان ۱۰۶۱ ساعت تامین شده است در حالی که این میزان در RCP ۲/۶ به ۱۰۴۹، RCP ۴/۵ به ۱۰۵۲ و RCP ۸/۵ به ۱۰۳۸ ساعت کاهش یافته است.



شکل ۵- مقایسه مجموع ساعات سرمایی سالانه ایستگاه یزد در دوره پایه (۱۳۶۷-۱۳۹۶) با پیش‌بینی‌های صورت گرفته توسط مدل CanESM2 تحت سناریوهای مختلف RCP در دهه‌های آتی (۱۴۰۰-۱۴۲۹)

به منظور بررسی میزان تامین نیاز سرمایی ارقام مختلف پسته، نسبت به مقایسه مجموع ساعات سرمایی سالانه در دوره پایه، پیش‌بینی مدل و همچنین محاسبه مازاد و یا کمبود نیاز سرمایی ارقام مختلف اقدام گردید.(جدول ۷)



**جدول ۷- مقایسه مجموع ساعت سرمایی در دوره پایه و پیش بینی مدل براساس سناریوهای مختلف RCP و میزان تأمین نیاز سرمایی ارقام مختلف پسته در ایستگاه یزد**

سناریو	مجموع ساعت سرمایی سالانه	ارقام پسته	نیاز سرمایی سالانه ارقام بر حسب ساعت	مازاد یا کمبود نیاز سرمایی ارقام بر حسب ساعت
پایه	۱۰۶۱	کله قوچی	۶۰۰	۴۶۱
		اوحدی	۸۰۰	۲۶۱
		احمد آقایی	۱۰۰۰	۶۱
		اکبری	۱۲۰۰	-۱۳۹
		فندوقی	۱۲۰۰	-۱۳۹
RCP۲/۶	۱۰۴۹	کله قوچی	۶۰۰	۴۴۹
		اوحدی	۸۰۰	۲۴۹
		احمد آقایی	۱۰۰۰	۴۹
		اکبری	۱۲۰۰	-۱۵۱
		فندوقی	۱۲۰۰	-۱۵۱
RCP۴/۵	۱۰۵۲	کله قوچی	۶۰۰	۴۵۲
		اوحدی	۸۰۰	۲۵۲
		احمد آقایی	۱۰۰۰	۵۲
		اکبری	۱۲۰۰	-۱۴۸
		فندوقی	۱۲۰۰	-۱۴۸
RCP۸/۵	۱۰۳۸	کله قوچی	۶۰۰	۴۳۸
		اوحدی	۸۰۰	۲۳۸
		احمد آقایی	۱۰۰۰	۳۸
		اکبری	۱۲۰۰	-۱۶۲
		فندوقی	۱۲۰۰	-۱۶۲

بر اساس نتایج حاصل در جدول ۷ می توان نتیجه گرفت:

- در دوره پایه، ۱۰۶۱ ساعت نیاز سرمایی تأمین شده است که این میزان برای تأمین نیاز سرمایی ارقام کله قوچی، اوحدی و احمد آقایی کافی و برای ارقام اکبری و فندقی ناکافی می باشد، بطوری که دو رقم اخیر -۱۳۹- ساعت کمبود نیاز سرمایی دارند.
- در سناریو ۲/۶ RCP ۱۰۴۹ ساعت نیاز سرمایی تأمین که این میزان برای تأمین نیاز سرمایی ارقام کله قوچی، اوحدی و احمد آقایی کافی و برای ارقام اکبری و فندقی ناکافی می باشد، بطوری که دو رقم اخیر -۱۵۱- ساعت کمبود نیاز سرمایی دارند.
- در سناریو ۴/۵ RCP ۱۰۵۲ ساعت نیاز سرمایی تأمین که این میزان برای تأمین نیاز سرمایی ارقام کله قوچی، اوحدی و احمد آقایی کافی و برای ارقام اکبری و فندقی ناکافی می باشد، بطوری که دو رقم اخیر -۱۴۸- ساعت کمبود نیاز سرمایی دارند.
- در سناریو ۸/۵ RCP ۱۰۳۸ ساعت نیاز سرمایی تأمین که این میزان برای تأمین نیاز سرمایی ارقام کله قوچی، اوحدی و احمد آقایی کافی و برای ارقام اکبری و فندقی ناکافی می باشد، بطوری که دو رقم اخیر -۱۶۲- ساعت کمبود نیاز سرمایی دارند.

نتایج این مطالعه از نظر کاهش انباست سرمایی در دهه های اخیر منطبق بر مطالعات فلاح قاله‌ری و همکاران (۱۳۹۷) است که نشان دهنده کاهش انباست سرمایی در ایستگاه های مناطق سردسیر و کوهستانی ایران است. همچنین سبزی پرور و همکاران (۱۳۹۴) در تحقیقی نشان دادند که به دلیل گرمایش جهانی، در سالهای آینده میزان نیاز سرمایی درختان خزان دار در استان همدان کافی نمی باشد. افزون بر این، نتایج بدست آمده از این تحقیق منطبق بر مطالعات آبورکوئرکو و همکاران (۲۰۰۸)، زانگ و همکاران (۲۰۱۶) و

سانتوز و همکاران (۲۰۱۶) است که نشان میدهد یکی از جنبه‌های بسیار مهم تغییر اقلیم بر باغ‌های میوه، کاهش انباشت سرمایی از طریق زمستان‌های ملایم است.

### نتیجه‌گیری

نیاز سرمایی فرایندی در طول پاییز و زمستان است تا گیاه بطور کامل در رکود و خواب قرار گیرد. این رکود در منطقه معتمله برای درختان میوه خزان کننده یک فاز از نمو محسوب می‌شود که اجازه می‌دهد درختان در شرایط نامساعد زمستان زندگانند و در فصل گل‌دهی، گل‌دهی مناسب و در نتیجه محصول مناسب داشته باشند.

مطالعه حاضر با هدف بررسی انباشت سرمایی زمستانه در دشت یزد-اردکان و با استفاده از آمار ایستگاه هواشناسی سینوپتیک یزد صورت گرفت، نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که میزان ساعت‌سرمایی مورد نیاز در دوره رکود درختان پسته طی سی سال گذشته (از سال ۱۹۸۸ لغاًیت ۲۰۱۷) روند کاهشی بوده و بطور میانگین، سالانه در حدود ۵/۷ ساعت از ساعت‌تامین نیاز سرمایی پسته کاسته شده است. همچنین طی دوره آماری مذکور، نیاز سرمایی سالانه پسته برای ارقامی نظیر کله‌قوچی و اوحدی تقریباً در همه سال‌ها تامین گردیده و برای ارقامی نظیر اکبری و فندقی هیچگاه بطور کامل تامین نشده است.

بین ساعت‌تجمعی ماهانه دماهای بین صفر تا ۷/۲ درجه سلسیوس و پارامترهای دمایی ماهانه نظیر، میانگین حداقل دما، میانگین حداقل دما و میانگین دمای ماهانه ارتباط رگرسیونی مناسبی برقرار است. این روابط که بصورت معادلات رگرسیونی قابل استخراج هستند، در شرایط عدم دسترسی به داده‌های ساعتی دمای هوا و برای مدل سازی و تعیین ساعت‌تجمعی ماهانه دماهای بین صفر تا ۷/۲ درجه سلسیوس به کمک پارامترهای دمایی ماهانه کاربرد دارند، بطوریکه با داشتن میانگین دمای حداقل، حداقل و یا میانگین در هر ماه، می‌توان با تقریب بالا به مجموع ساعت‌سرمایی در هر ماه دست یافت. همچنین در بین متغیرهای مذکور، پارامتر میانگین دما نسبت به پارامترهای میانگین حداقل و میانگین حداقل برای مدل سازی مناسب‌تر می‌باشد که در نهایت بر مبنای آن، مدل سازی انجام شد. این روش یکی از تفاوت‌های این مطالعه با سایر مطالعاتی است که به منظور محاسبه ساعت‌سرمایی در گیاهان مختلف صورت گرفته است.

بر اساس یافته‌های جدول ۶، جمع ساعت‌سرمایی سالانه در دوره پایه ۱۰۶۱ ساعت می‌باشد که این میزان در سناریوهای RCP2/۶ به ۱۰۴۹، RCP4/۵ به ۱۰۵۲ ساعت و RCP8/۵ به ۱۰۳۵ ساعت کاهش یافته است، بنابر این نیاز سرمایی ارقام احمد آقایی، اوحدی و کله‌قوچی در منطقه مورد مطالعه در سال‌های آتی (۱۴۰۰-۱۴۲۹) تامین و نیاز سرمایی ارقام اکبری و فندقی تامین نمی‌گردد. شبیب کاهشی در سری انباشت سرمایی در پیوند با گرمایش جهانی، همچنین افزایش امواج و دوره‌های گرمایی در دوره سرد سال، می‌تواند زنگ خطری برای کشت ارقام مختلف پسته باشد که باید در برنامه ریزی‌های آتی در نظر گرفته شود و برنامه ریزان امر کشاورزی باید از ارقام مناسب با شرایط پیش رو برای کاشت اقدام نمایند.



## منابع

- اکبری، وجیهه؛ کمالی، غلامعلی؛ جوانشاه، امان الله (۱۳۹۲). تعیین نیاز سرمایی پسته و رابطه‌ی بین میانگین دمای روزانه و نیاز سرمایی (مطالعه شهرستان‌های کرمان و رفسنجان). دومین کنفرانس بین‌المللی مدل سازی گیاه، آب، خاک و هوای کرمان.
- جعفری ندوشن، علی؛ احمدیان، حسنعلی (۱۳۸۷). پسیل معمولی پسته (شیره خشک) و راههای کنترل آن، سازمان جهاد کشاورزی استان یزد، نشریه شماره ۱۱۷، صص ۱-۱۵.
- حسینی فرد، سید جواد؛ بصیرت، مجید؛ صداقتی، ناصر؛ اخیانی، احمد (۱۳۹۶). مدیریت تلقیقی حاصلخیزی خاک و تقدیمه در درختان پسته. وزارت جهاد کشاورزی، موسسه تحقیقات علوم باگبانی (پژوهشکده پسته کشور)، موسسه تحقیقات خاک و آب.
- حکم آبادی، حسین؛ جوانشاه، امان الله (۱۳۸۳). تامین نیاز سرمایی و اهمیت آن در پسته. شورای انتشارات موسسه تحقیقات پسته کشور. صص ۴۰.
- خسروی، محمود؛ اسماعیل نژاد، مرتضی؛ نظری پور، حمید (۱۳۸۹). تغییر اقلیم و تاثیر آن بر منابع آب خاور میانه. چهارمین کنگره بین‌المللی جغرافیادان جهان اسلام، ایران، زاهدان. صص ۸.
- سبحانی، بهروز؛ اصلاحی، مهدی؛ بابایان، ایمان (۱۳۹۳). کارایی الگوهای ریز مقیاس نمایی مدل LARSWG و SDSM در شبیه سازی متغیرهای هواشناسی در حوزه آبریز دریاچه ارومیه. نشریه پژوهش‌های جغرافیای طبیعی. دوره ۴۷، شماره ۴، صص ۴۹۹-۵۱۶.
- سبزی پور، علی اکبر؛ نوروز ولاشی، رضا (۱۳۹۴). اثر تغییر اقلیم بر روند تامین نیاز سرمایی گیاهان خزان دار (مطالعه موردي: استان همدان). نشریه علوم باگبانی، جلد ۲۹، صص ۳۵۸-۳۶۷.
- طائی سعیرمی، سیاوش؛ مرادی، حمید رضا؛ خداقلی، مرتضی (۱۳۹۳). شبیه سازی و پیش بینی برخی متغیرهای اقلیمی توسط مدل چند گانه خطی SDSM و مدل‌های گردش عمومی جو (مطالعه موردي: حوزه آبخیز بار نیشابور). نشریه انسان و محیط. شماره ۲۸، صص ۱-۱۶.
- طلایی، علیرضا (۱۳۷۷). فیزیولوژی درختان میوه مناطق معتدل. انتشارات دانشگاه تهران.
- فلاح قاله‌ی، غلامعباس؛ احمدی، حمزه (۱۳۹۷). واکاوی انباست سرمایی مناطق سردسیر ایران بر اساس مدل‌های CH، CP، Utah، مجله جغرافیا و توسعه، شماره ۵۱، صص ۹۹-۱۲۰.
- قاسمی فر، الهام؛ علیجانی، بهلول؛ سلیقه، محمد (۱۳۹۵). بررسی تغییرات دمایی سواحل جنوبی خزر با استفاده از سه مدل LARSWG و sdsm و مدل شبکه عصبی مصنوعی. فصل نامه جغرافیای طبیعی. شماره ۳۴، صص ۲۳-۴۰.
- کوچکی، علیرضا؛ نصیری محلاتی، مهدی؛ جعفری، لیلا (۱۳۹۴). بررسی تاثیر تغییر اقلیم بر کشاورزی ایران، پیش بینی وضعیت آگرولکلیماتیک آینده، نشریه پژوهش‌های زراعی ایران، جلد ۱۳، شماره ۴، صص ۶۵۱-۶۶۴.
- مسعودیان، سید ابوالفضل (۱۳۸۳). بررسی روند دمایی ایران در نیم سده‌ی گذشته. مجله جغرافیا و توسعه. صص ۸۹-۱۰۶.
- نصیری محلاتی، مهدی؛ کوچکی، علیرضا (۱۳۸۵). آنالیز شاخص‌های آگرولکلیماتیک ایران در شرایط تغییر اقلیم، مجله پژوهش‌های زراعی ایران، شماره ۱، صص ۱۶۹-۱۸۲.
- وزارت جهاد کشاورزی. موسسه تحقیقات پسته. ۱۳۹۷.
- Abuquerque N., Garcia montiel F., Carrillo A., Burqos L. (2008). Chilling and heat requirements of sweet cherry cultivars and relationship between altitude and the probability of satisfying the chill requirements. Environmental and Experimental Botany, 64, 162-170.

- Arora, V.K., Scinocca, J.F., Boer, G.J., Christain, J.R., Denman, k.l., Flato, G.M., Kharin, V.V., Lee, W.G. and Merryfield, W.J.(2011).Carbon emission limits required to satisfy future representative concentration pathways of greenhouse gases.Geophysical Research Letters,38(5),1-6.
- Baldocchi, D. wong,s .(2008). Accumulated winter chill is decreasing in the fruit growing regions of California, Climatic Change, 87:153.166 .
- Elloumi ,o., Ghrab. m., Kessentini, H., and Mimoun, m. b.(2013). Chilling accumulation effect on performance of pistachio trees cv. Mateur in dry and warm area climate. Scientia Horticulture,159:80-87.
- Guo, L., Dai, J., Ranjitkar, s. , Yu H., Xu, J. , Luedeling , E.(2014). Chilling and heat requirements for flowering in temperate fruit trees. International Journal of Biometeorology, 58 (6).1195-1206.
- kaufmann, H. ,Blanke, m.(2016). Performance of three numerical models to assess winter chill for fruit trees- a case study using cherry as model crop in Germany regional Environmental change, 16:1-9.
- Khan,M.S.Coulibaly,P.Dibike,Y.(2006).Uncertainly Analysis of Statistical Downscaling Methods,Journal of Hydrology,319:357-382.
- Lopes,P.G.,Aguiar,R.Casimiro,e.(2008).Assessment of Climate Change Statistical Downscaling Methods,Application and Comparison of Two Statistical Metods to a Single site in Lisbon
- Rosenzweig. Cynthia, and M.l.parry.(1994). Potential impact of climate change on world food supply.Nature, 376:133-138.
- Santos,J.A.,Costa,R.,Fraga,H.(2016).Climate change impacts on thermal growing condition of main fruit species in Pourtugal.Climatic Change,139:1-14.
- Weinberger, JH .(1950). Chilling requirements of peach varieties.In proceedings. American Society of Horticultural Science, 56.122-128.
- Wilby,R.L.,Dawson,C.W.,Murphy,C.,Connor,P.O.,Hawkins,E.(2014).The Statstical DownStcaling Model Deeision Centric(SDSM-DC)conceptual basis and applications.Climate Research,61(3).251-268.
- Zhuang,W.Cai,B.Gao,z.Zhang,z.(2016). Determination of chilling and heat requirements of 69 Japanese apricot cutivars.European Journal of Agronomy,74:68-74.
- Zohary,M.(1952). Amonographical study of genus pistacia. PalestinJ. Bot (Jerusalem Series ),5,187-228.